



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل  
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي  
King Fahad Hospital The University

## الإرشادات اللازم اتباعها لعملية كبسولة قياس حموضة المريء

(قبل العملية)

توقف عن أخذ :



- الأدوية المثبطة للحموضة (مثل بانتوبرازول , نكسيوم ) لمدة 7 أيام على الأقل قبل العملية .
- الادوية المثبطة ( مثل الزينتك ) لمدة يومين على الأقل قبل العملية .
- مضادات الحموضة ( مثل مالوكس ) لمدة 6 ساعات على الأقل قبل العملية .
- الصيام لمدة لا تقل عن 8 ساعات.
- الحضور في وقت العملية المحدد من قبل القسم.

### PRE-OP PATIENT INSTRUCTION BEFORE THE 24PH MONITORING

DO NOT Take



- proton pump inhibitor medication (like OMEPRAZOLE, PANTOPRAZOLE) 7 days before procedure.
- H2 blocker (like RANITIDINE, FAMOTIDINE, NIZATIDINE) 2 days before procedure.
- Antacid (like MAALOX) 6 hours before the procedure.
- Come to the appointment fasting at least 8 hours.