




جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University



أنواع الجراحات العلاجية لسرطان القولون والمستقيم

1

جراحة استئصال الورم الأساسي:

يفضل دائماً استئصال أي ورم سرطاني في القولون أو المستقيم القابل للاستئصال وغير مصاحب لأي انتشار في أعضاء أخرى، ويعتمد طول الاستئصال الذي يتم إجرائه على موقع الورم في القولون والمستقيم.

2

استئصال الأعضاء المصابة بالخلايا السرطانية المنتشرة من سرطان القولون (الانبثاثات):

يُنصح به للمرضى الذين يعانون من أعضاء مصابة قابلة للاستئصال (مثل الكبد و/أو الرئة). قد يحسن بشكل كبير من بقاء المرضى الذين يعانون من مرض محدود الانتشار.

3


استئصال العقدة الليمفاوية:

يتم إجراؤها بشكل روتيني مع استئصال الورم الرئيسي.



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University



التدخلات الجراحية

دواعي الاستعمال

نوع الاجراء لسرطان القولون

ورم في الأعور والقولون الصاعد

استئصال نصف القولون الأيمن

ورم في القولون النازل

استئصال النصف الأيسر

ورم في القولون السيني

استئصال القولون السيني

سرطانات متعددة البؤر
مرض القولون الأساسي

استئصال القولون الجزئي أو الكلي من البطن

ورم بالقرب من الثنية الكبدية أو في القولون
المستعرض القريب أو الأوسط

تمديد استئصال النصف الأيمن