

قسم المسالك البولية

ماذا يحتاج أن تعلم عن عملية ختان الأطفال حديثي الولادة

إعداد:

د. أسامة الصويان
أستاذ مساعد

إستشاري جراحة المسالك البولية لدى الأطفال
قسم جراحة المسالك البولية
مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر




مقدمة

سوف يتم عمل ختان لطفلك باستخدام إحدى طريقتين:

١. استخدام مشبك Gomico حيث يتم إزالة الجلد الزائد في لحظتها بدون وجود أي حلقات على الذكر بعد العملية.

٢. استخدام حلقة بلاستيكية (Plastibell) على الجلد الزائد في الذكر تعمل على منع وصول الدم إلى الجلد الزائد مما يؤدي إلى سقوطه تلقائياً بعد ٥-١٠ أيام. إن تغير لون الجلد حول الحلقة إلى بني غامق أو أسود يعد أمر طبيعياً وسيعود إلى اللون الطبيعي تلقائياً بعد سقوط الحلقة.

صورة توضيحية تبين شكل الذكر لطفلك بعد عملية الختان في حال استعمال الحلقة البلاستيكية (Plastibell)



ما قبل عملية الختان

حمم طفلك كالمعتاد في صباح العملية. اغسل جيد منطقة الذكر وما جاورها. قبل عملية الختان مباشرة قم بتغيير حفاظ طفلك. قم بإحضار حفاظ آخر نظيف للإستعمال ما بعد عملية الختان. يستطيع طفلك أن يرضع بشكل طبيعي إلى ما قبل العملية بساعة. يستحسن إعطاء طفلك شراب بنادول ما قبل عملية الختان. قم بإحضار لهاية (مصاصة) لطفلك.

ما بعد عملية الختان

الإستحمام

في أول يومين بعد العملية، قم بتنظيف جسم طفلك بإستخدام إسفنجة مبللة للتنظيف. تستطيع تحميم طفلك في حال وجود براز على منطقة العملية أو في حال عدم قدرة الطفل على التبول. حمم طفلك بعد ذلك من مرة إلى مرتين في اليوم إلى أن تقع الحلقة في حال إستعمالها.

الحفاظ

قم بتغيير حفاظ طفلك في أسرع وقت ممكن في حال إتساخه. قم بدهن منطقة العملية في الذكر بمهزم فيوسيدين (Fucidine) في كل مرة تقوم فيها بتغيير الحفاظ ولمدة شهر من تاريخ العملية.

الألم

أعط طفلك شراب البنادول كل ٦-٨ ساعات بإنتظام لمدة ٢٤-٤٨ ساعة بعد العملية.

النشاط والحركة

تجنب وضع أي ضغط على منطقة الذكر. تأكد أن حزام أمان كرسي الطفل في السيارة لا يكون مشدود بقوة بين فخذي الطفل.

ماذا يجب عليك أن تلاحظ

النزيف

من الطبيعي وجود القليل من الدم في حفاظ طفلك لعدة ساعات بعد عملية الختان وكذلك بعد سقوط الحلقة البلاستيكية في حال إستعمالها. في حال إستمرار النزيف بكميات كبيرة الرجاء إستشارة طبيبك.

الالتهاب

من الطبيعي وجود تورم وكدمات في الذكر في الأسابيع الأولى بعد عملية الختان. من المحتمل أن يحتاج التورم عدة شهور حتى يختفي بالكامل. في حال أن الورم يزداد مع وجود إحمراء، ألم أو حرارة أكثر من (٣٨,٥°C) قم بإستشارة طبيبك للتأكد من عدم وجود إلتهاب.

متى تتصل بطبيبك

قم بالاتصال على قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى الملك فهد الجامعي رقم :
٠١٣٨٩٦٦٦٦٦٦ تحويلة : ١٠٥١

في حالة وجود إحدى الحالات التالية:

١. نزيف مستمر وبكميات كبيرة
٢. إزدیاد تورم الذکر مع وجود إحمرار وسخونة في منطقة العملية أو في حال وجود إفرازات صفراء من منطقة العملية
٣. إرتفاع درجة حرارة طفلك أو وجود ألم مستمر
٤. عدم تبول طفلك خلال الـ ١٢ ساعة الأولى بعد العملية
٥. عدم سقوط الحلقة البلاستيكية خلال ١٠ أيام من العملية